

## NYÁRI TŐZIKE (*Leucojum aestivum*)

### JELLEMZÉSE:

Az amarilliszfélék (*Amaryllidaceae*) családjába tartozó csoportosan fejlődő hagymás növényünk, mely kora tavaszi rokonától, a tavaszi tőzikétől eltérően sokkal magasabb, akár 35-60 cm-re is képes megnőni.

Levelei húsosak, szálalakúak, csúcsuk általában lekerekített.




A szár végén 3-7 virág fejlődik. A harang alakot formázó fehér lepellevelek 15-20 mm hosszúak, csúcsukon sárga, sárgászöld folt van. A virágzás áprilistól június elejéig tart. Termése húsos toktermés.



### ÉLŐHELYE:

Inkább mészkedvelő; nedves vagy időnként vízzel borított talajokon - liget- és láperdőkben, mocsárréteken, magassásos társulásokban - él.





### Elterjedési térkép (FHNPI)

-  *Leucojum aestivum*
-  Védett területek
-  GYMS\_megyehatár



### FŐBB VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK:

-  Élőhely: megszűnés, átalakítás, inváziós fajok térhódítása
-  Faj: dekoratív jellege miatti tömeges gyűjtés, kiásás, fényképezés